IDENTIFICATION DE QUELQUES ESPÈCES DE NOCTUELLES

ÉTAT LARVAIRE

La noctuelle de la betterave
(Spodoptera exigua)

25-38 mm
en fin de développementt

La noctuelle de la tomate
(Helicoverpa armigera)

30-40 mm
en fin de développement

La noctuelle de l'artichaut
(Chrysodeixis chalcites)

~ 40 mm
en fin de développement
Arpenteuse

La noctuelle gamma
(Autographa gamma)



40-45 mm
en fin de développement
Arpenteuse



ÉTAT ADULTE

17-30 mm d'envergure
2-3 générations / an

40 mm d'envergure
2 à 3 générations / an



32-37 mm d'envergure
3 à 4 générations / an

30-40 mm d'envergure
2 à 3 générations / an

- *Les noctuelles sont difficiles à observer sur la culture car elles ont essentiellement une activité nocturne.*
- *Les couleurs peuvent varier du vert au brun pour les chenilles et du brun clair au brun foncé pour les papillons en fonction de la plante hôte, du stade de développement et du climat.*

BIOPLANET
insectes utiles

IDENTIFICATION DE QUELQUES ESPÈCES DE NOCTUELLES

La noctuelle du chou
(Mamestra brassicae)

ÉTAT LARVAIRE



40–50 mm
en fin de développement
S'enroule quand on la touche

ÉTAT ADULTE



40-50 mm d'envergure
2 à 3 générations / an

La noctuelle terricole
(Agrotis ipsilon)

ÉTAT LARVAIRE

40–50 mm
en fin de développement



ÉTAT ADULTE



45 mm d'envergure
1 à 3 générations / an

La noctuelle des moissons
(Agrotis segetum)

ÉTAT LARVAIRE

45–50 mm
en fin de développement

ÉTAT ADULTE

40 mm d'envergure
1 à 3 générations / an

La noctuelle potagère
(Lacanobia olearacea)

ÉTAT LARVAIRE



Jusqu'à 50 mm
en fin de développementt
S'enroule quand on la touche



ÉTAT ADULTE

30-40 mm d'envergure
1 à 3 générations / an

- *Les noctuelles sont difficiles à observer sur la culture car elles ont essentiellement une activité nocturne.*
- *Les couleurs peuvent varier du vert au brun pour les chenilles et du brun clair au brun foncé pour les papillons en fonction de la plante hôte, du stade de développement et du climat.*

BIOPLANET
insectes utiles