Fiche technique

Rév. 11/23

AMBLYSEIUS CUCUMERIS
Prédateur de thrips

Introduction

Amblyseiulus cucumeris est un acarien prédateur utilisé pour lutter contre les thrips.

Biologie

Cette espèce cosmopolite est utilisée avec succès depuis de nombreuses années pour lutter contre Frankliniella occidentalis sur les légumes et les plantes ornementales sous serre. Elle se nourrit principalement des larves de thrips, en particulier des premiers stades larvaires, et/ou des espèces de thrips de petite tailles, mais consomme aussi diverses espèces d'acariens ravageurs dans les cultures ornementales, fruitières et maraîchères (comme le tarsonème du fraisier et le tarsonème des serres), du nectar et du pollen. Son efficacité dépend principalement de la taille des proies disponibles, ainsi que de la température (conditions optimales entre 20 °C et 25 °C) et de l'humidité relative (de 66 à 70%).

Conditionnement

AmblyPAK et AmblySAK contiennent 50 000 ou 250 000 adultes mélangés à du matériel inerte dans un cylindre carton de 1L ou un sac papier de 4L. AmblyBags contient 500 sachets de 1000 individus.

Cultures

Poivron, fraise, aubergine, pépinières.

Instructions

Conservez le colis au sec et à l'obscurité dans un endroit sombre et frais (8-10°C) et libérez-les dès que possible après leur arrivée ou après quelques jours tout au plus.

Applications

Répartir uniformément le matériel sur les feuilles, évitez de les répandre au sol (due aux fourmis et autres prédateurs). Faites les introductions quand les feuilles se touchent, ils peuvent alors prospecter d'une plante a l'autre.
Accrochez le sachet sur la plante, à l'abri du soleil direct.

50/m2 en préventif ou 100/m2 en curatif, 1 sachets par mètre linéaire chaque 5 semaines. Introduction tous les 10 jours à 2 semaines pour le vrac en période critique.

BIOPLANET FRANCE, 10 av. Pierre Latécoère, 82100 Castelsarrasin, 07 57 43 41 73,
www.insectesutiles.fr ► info@insectesutiles.fr