



ERETMOCERUS EREMICUS

Parasitoïde d'aleurodes



Introduction

Eretmocer eremicus est un parasitoïde d'aleurodes.

Biologie

Eretmocer eremicus est une petite guêpe qui se développe comme un ecto-endoparasitoïde de tous les stades larvaires d'aleurodes (mais de préférence du 2ème et 3ème stade). Il parasite avec succès les aleurodes les plus communs dans les serres, *Trialeurodes vaporariorum* et le complexe de *Bemisia*. Il exerce aussi une action prédatrice car les adultes se nourrissent en aspirant le contenu des jeunes larves d'aleurode. De cette façon, il est capable de réduire les populations à haute densité d'aleurodes dans une courte période, grâce aussi à la haute charge d'œufs de la femelle et au taux maximal de parasitisme qui est atteint peu après son émergence.

Eretmocer eremicus résiste mieux aux hautes températures qu'*Encarsia formosa*. En fait, les températures optimales pour son développement et la production des œufs correspondent à 25-29 °C. Environ 74% des larves sondées avec l'ovipositeur sont parasitées. On y ajoute l'action prédatrice et de recherche agressive de la part de la femelle.

Conditionnement

EREMIPAK contient 3 000 ou 15 000 pupes mélangées à du matériel inerte.

Cultures

Cultures maraîchères et ornementales. Il est utilisé dans les serres et sur le tabac, en particulier en conditions de températures élevées.

Instructions

Conservez le colis au sec et à l'obscurité dans un endroit sombre et frais (8-10°C) et libérez-les dès leur arrivée ou après quelques jours tout au plus.

Applications

Répartir dans la culture, près de foyers ou dégâts en commençant par le périmètre et en utilisant des boîtes de lâcher.

1/m²/semaine en préventif ou 5 ou plus/m²/semaine en curatif.

