


suprema+



BIOPLANET
insectes utiles

info@bioplanet.fr
www.bioplanet.eu

CONTENU

1 piège à assembler + 1 paire de ailettes blanches
1 onglet de surveillance de capture

ASSEMBLAGE

1. Montez le dispositif d'entonnoir sur le corps principal du piège en le bloquant dans les joints.
2. Montez les deux ailettes blanches pour former une croix à l'aide des joints et insérez-le sur le dispositif d'entonnoir en utilisant les quatre pieds.
3. Placez le couvercle circulaire du piège en insérant complètement les quatre pieds dans les joints appropriés.
4. Puis insérez complètement le panier de support pour le diffuseur dans le trou prévu dans le couvercle circulaire. Fixez les fils de support en enfilant les extrémités dans les deux anneaux opposés sur le couvercle

ACTIVATION

1. Ouvrez l'emballage du diffuseur de la phéromone.
2. Insérez le diffuseur de la phéromone dans le panier du piège et fermez-le.
3. Insérez le panier avec le diffuseur dans le trou au centre du couvercle.
4. Jetez l'emballage vide ayant contenu la phéromone très loin du piège.
5. Placer le piège au niveau du sol.

REMARQUE

Les diffuseurs libèrent la phéromone attractive de manière constante et prolongée. Les mâles de l'espèce cible sont attirés par la phéromone sexuelle et sont piégés.

Pour empêcher les individus capturés de s'échapper pendant le contrôle des pièges, il est recommandé d'utiliser de l'eau (au moins 3 cm) avec un savon ou une huile ou autre substance non répulsive.

Les diffuseurs doivent être remplacés au plus tard au bout de 4 semaines.

Pour le suivi au moins deux pièges sont toujours nécessaires. A ceux-ci, il est préférable d'en ajouter un pour chaque hectare de surface, après le premier.

Entre les différents pièges à phéromones (même si avec des attractifs pour espèces différentes), il est généralement nécessaire de garder une distance d'environ 40 mètres.

Le contrôle des pièges doit être effectué au moins une fois par semaine, voire plus fréquemment pendant les périodes critiques ou de fréquence maximale de l'organisme nuisible.

Les insectes capturés doivent être enlevés et leur nombre peut être enregistré sur l'onglet de surveillance fourni avec le piège.

Les diffuseurs de phéromones peuvent être conservés jusqu'à deux ans s'ils sont conservés à 4 °C.